

身体障がい者障がい程度等級表（１級対象）【抜粋】

【注意事項】

高齢者肺炎球菌

高齢者インフルエンザ

高齢者新型コロナウイルス

60～64歳で①～④に該当する方が
定期接種の対象となる。

高齢者带状疱疹：60～64歳で④に該当する方が定期接種の対象となる。

① 心臓機能障がい

ア 次のいずれか二以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作が起こるもの。

- a 胸部エックス線写真所見で心胸比0.60以上のもの
- b 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があるもの
- c 心電図で脚ブロック所見があるもの
- d 心電図で完全房室ブロック所見があるもの
- e 心電図で第二度以上の不完全房室ブロック所見があるもの
- f 心電図で心房細動又は粗動所見があり、心拍数に対する脈拍数の欠損が10以上のもの
- g 心電図でSTの低下が0.2mV以上の所見があるもの
- h 心電図で第Ⅰ誘導、第Ⅱ誘導及び胸部誘導（ただし、V₁を除く。）のいずれかのTが逆転した所見があるもの

イ 人工ペースメーカーを装着したもの又は人工弁移植、弁置換を行ったもの

② じん臓機能障がい

じん臓機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml／分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg／dl以上であって、かつ、自己の身の日常生活活動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要とするもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。

③ 呼吸器機能障がい

予測肺活量1秒率、動脈血ガス及び医師の臨床所見により、呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの、呼吸障害のため予測肺活量1秒率の測定ができないもの、予測肺活量1秒率が20以下のもの又は動脈血O₂分圧が50Torr以下のものをいう。予測肺活量1秒率とは、1秒率（最大呼気位から最大努力下

呼出の最初の1秒間の呼気量)の予測肺活量(性別、年齢、身長 of の組み合わせで正常ならば当然あると予測される肺活量の値)に対する百分率である。

④ ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がい

ヒト免疫不全ウィルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。

ア CD四陽性Tリンパ球数が $200/\mu\text{l}$ 以下で、次の項目(a～l)のうち六項目以上が認められるもの。

- a 白血球数について $3,000/\mu\text{l}$ 未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- b Hb量について男性 12g/dl 未満、女性 11g/dl 未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- c 血小板について $10\text{万}/\mu\text{l}$ 未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- d ヒト免疫不全ウィルス-RNA量について $5,000$ コピー/ ml 以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- e 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある
- f 健常時に比して10%以上の体重減少がある
- g 月に7日以上 of の不定の発熱(38°C 以上)が2か月以上続く
- h 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月の7日以上ある
- i 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
- j 口腔内カンジタ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウィルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある
- k 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
- l 軽作業を超える作業の回避が必要である

イ 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの