極早生品種（つや姫）

有機水稲栽培暦（出雲市版）

出雲市環境にやさしい農業研究会

月	3			4			5			6			7			8			9			10			11月以降		
旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下

生育段階

播種期　田植期　幼穂形成期　出穂期　成熟期

区分

育　苗　活着期　分げつ増加 最高分げつ期（6月下旬）　幼穂形成・穂ばらみ　登熟

抑草ロボット

自動抑草ロボット稼働期間

○旧型（ｱｲｶﾞﾓﾛﾎﾞ1）　※田植え後約3週間程度

※田植え翌日から投入

○新型（ｱｲｶﾞﾓﾛﾎﾞ2）　※草丈30cm程度

※田植え4～5日後（活着後）から投入
※ほ場は均平にし、稼働時は水深5～10cmを維持する
※1日あたりの稼働時間は2h/10a以内

水管理

自動抑草ロボットが座礁しない程度

早期湛水　（水深5～10cm）　深水管理（水深10cm程度）　中干し　間　断　潅　水　落水

作業内容

育苗管理　ほ場管理　ほ場管理

入水畦塗り　荒代かき①　種子予措（温湯消毒・種子消毒）　播種　荒代かき②（雑草が多い場合は再度代かきを行う）　苗追肥　田植え・基肥　植代（本代）　補完的除草　中干し　穂肥（追肥）　落水　収穫（稲刈り）　有機物散布　秋耕

ポイント

植代(本代)


田植え

育苗管理
- 温湯消毒は60℃、10分間
- 浸種は積算水温100℃
- 播種量は乾籾換算で80～100ｇ/箱程度
- 育苗期間は40日程度（4葉以上）
- 追肥：播種後20日後
  有機アグレット666［15g/箱］
- 葉色が淡い場合は10日後に同量を再度追肥

ほ場管理
- 植代(本代)：雑草が大きい場合は浅水の植代で練り込む
- 田　植　え：栽植密度は株間18cm、1株4本程度。田植機の横送り回数を20回に設定
- 基　　肥：有機アグレット666［30～35kg/10a］
- 深水管理　：40日程度
- 水　管　理：間断潅水により根の力を維持。田面を徐々に固めて収穫作業に備える
- 除　　草：こまめにほ場を見回って雑草が残った場合は手取り除草を行う
  自動抑草ロボット引上げ後、草が多い場合は機械除草又は手取り除草を行う
- 中　干　し：田面に小ひびが入る程度
- 穂肥(追肥)：有機アグレット727［30kg/10a］

田植え30日

田植え60日

田植え90日

稲刈り前

稲刈り
- 適期刈取り
  （青味籾率10～15%程度）

ほ場管理　年内実施
- 堆肥散布
  1～2t/10a
- 米ぬか散布
  50～100kg/10a

※米ぬか散布は土質によって変わります